

**Pain Relief**  
**Örondroppar/ Øredråper/ Øredråber**

(SV)

**Innehåll:**

1. Vad Bloxoto Pain Relief är och vad det används för
2. Viktig information före användning
3. Hur du använder Bloxoto Pain Relief
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bloxoto Pain Relief ska förvaras
6. Övriga upplysningar

**Ingredienser:** vattenfri glycerol (99,5%), lidokainhydrokloridlösning (0,5%)**1. Vad Bloxoto Pain Relief är och vad det används för**

Bloxoto Pain Relief örondroppar är en medicinteknisk produkt vars verkan är baserad på glycerols osmotiska egenskaper. Huvudkomponenten i Bloxoto Pain Relief är glycerol. Glycerol har två grundkaraktäristiska egenskaper som är relevanta för dess användning i örondroppar:

- I) den oljiga konsistensen av glycerol gör att den fäster försiktigt mot huden vid appliceringsstället och även har skyddande egenskaper.
- II) glycerolens vätningssförmåga, vilket i sin tur gör att topiskt applicerat glycerol avlägsnar vatten från svullna vävnader (osmotisk effekt) vilket resulterar i minskad svullnad och därmed smärtlindring.

Glycerolen i Bloxoto Pain Relief mjukar upp vax, hjälper att avlägsna växet och tack vare sina vätskebindande egenskaper tar den bort överskottet av vätska från vävnaden i hörselgången (osmotisk effekt), vilket i sin tur leder till eliminering av sjukdomar som uppstår vid inflammatoriska tillstånd i öronen såsom smärta i öronen och svullnad.

Lidokain används som hjälpmiljö i Bloxoto Pain Relief, för att bedöva hudytan, vilket förstärker effekten och dessutom lindrar smärtan i örat.

Bloxoto Pain Relief har en stödjande effekt vid:

- inflammatoriska tillstånd karaktäriserade av svullnad, smärta och klåda i ytter hörselgången.
- sjukdomar som åtföljs av smärta orsakade av regelbunden exponering för vatten och fukt, t.ex. en simbassäng.
- sjukdomar som åtföljs av smärta orsakad av långtidsanvändning av horrlurar eller vax, som tapper till den ytter hörselgången.
- sjukdomar som åtföljs av smärta orsakad av frekvent användning av rengöringsmedel, som förstör det naturliga membranet som skyddar den ytter hörselgången, t.ex. schampo, tvål, gel.

Bloxoto Pain Relief kan användas till barn från 6 månaders ålder.

**2. Viktig information före användning****Kontraindikationer och varningar****Använd inte Bloxoto Pain Relief**

- om förpackningen är skadad;
- om trumhinnan är skadad (dvs. kronisk otitis media);
- om du är allergisk mot någon av produktens komponenter sedan tidigare;
- om utgångsdatumen på förpackningen har passerat;
- om patienten kommer från en operation eller kirurgiskt ingrepp i örat;
- **hos barn under 6 månaders ålder:**
  - vid långvarig smärta eller svullnad orsakad av inflammatoriska tillstånd med bakteriell infektion eller svamp som orsak, dessa besär kräver kontakt med läkaren;
  - vid rinnande öron - läckage från örat.
- Bloxoto Pain Relief ska endast användas efter en noggrann otoskopisk undersökning utförd av en läkare.
- Bloxoto Pain Relief ska irlt appliceras i örat samtidigt som en hörapparat sitter i, Bloxoto Pain Relief ska appliceras en timme innan hörapparaten sätts in i den ytter hörselgången.
- Trots att de inte finns något bevis på att Bloxoto Pain Relief droppar har en negativ effekt vid användning under graviditet och amning så bör du rådfråga läkare om användningen av Bloxoto Pain Relief droppar så att läkaren kan bedöma om den förväntade nytten med Bloxoto Pain Relief överstiger den potentiella risken.
- Om symptomen blir värre eller inte förbättras efter tre dagars användning med Bloxoto Pain Relief örondroppar, eller om du har feber, kontakta din läkare. Långvarig smärta eller svullnad kan vara tecken på bakteriell eller svampinfektion och kan kräva ytterligare eller mer lämplig behandling.
- Endast för utvärds bruk. Undvik kontakt med slämhinna i ögon, mun, hals och näsa.
- Bloxoto Pain Relief är avsett för tillfällig smärtlindring i öronen, under högst 3 dagar och ska inte användas under längre tid.

**Användning med andra medicintekniska produkter/läkemedel**  
 Interaktioner med andra produkter har inte studerats. Det är dock känt att antiarytmiska läkemedel förvärkar biverkningarna av lidokain; samtidig användning kan leda till allvarliga biverkningar. Cimetidin, betablockerare, noradrenalin och inhalerade bedömningsmedel hämmar lidokainmetabolismen genom minskat leverflöde, vilket leder till ökade serumläkemedeltnivåer.

Barbiturater, rifampicin och fenytoin påskyndar metabolismen av lidokain genom aktivering av mikrosomala enzymer i levern. Lidokain ökar effekten av muskelavslappnande medel. I tillverkaren rekommenderar inte användning av andra produkter i form av örondroppar eller sprayar under användning av Bloxoto Pain Relief. Användning av andra produkter i form av droppar eller spray bör rådfrågas med läkare eller apotekspersonal.

Innan du applicerar Bloxoto Pain Relief, berätta för din läkare eller apotekspersonal om andra produkter som används i örat och alla läkemedel som nyligen tagits, inklusive de som är receptfria. Efter användning av Bloxoto Pain Relief rekommenderas det att inte använda andra öronprodukter produkter, i minst 30 minuter.

**3. Hur du använder Bloxoto Pain Relief**

1. Tvätta händer och skruva av korken från flaskan.
2. Luta huvudet och lägg dig på sidan så att örat du ska behandla är uppåt.
3. Dra försiktigt i öronsönbibben (nedre delen av hörselgången) bort från nacken.
4. Vänd den öppnade Bloxoto Pain Relief flaskan upp och ned och genom att trycka på flaskans båda sidor, droppar du ut 2 droppar av produkten i örat.
5. Håll huvudet lutat i några minuter så att dropparna kan komma in i hörselgången.
6. Torka bort överflödig vätska med rent papper.
7. Dessutom rekommenderas det att täppa till den ytter hörselgången med bomull efter applicering.
8. Skruva på korken igen.

**Dosering**

**Vuxna och barn från 12 års ålder:** 2 droppar i örat upp till tre gånger dagligen. Om ingen förbättring sker efter 3 dagar, eller om du mår sämre, rådfråga din läkare.

**Barn från 6 månaders ålder:** 2 droppar i örat upp till tre gånger dagligen. Används endast under överinseende av en vuxen eller läkare. Om ingen förbättring sker efter 3 dagar, eller om ditt barn mår sämre, rådfråga din läkare.

**Vid användning hos barn är det nödvändigt att skydda örat med bomull.** Bloxoto Pain Relief ska inte användas hos barn som är yngre än 6 månader. Behandlingsresultatet ska övervakas av läkare.

**4. Eventuella biverkningar**

Bloxoto Pain Relief tolereras väl och inga skadliga effekter är kända

vid användning. Vid allergi eller andra oönskade effekter, informera din läkare eller apotekspersonal och sluta använda dropparna. Bloxoto Pain Relief ska endast användas i enlighet med bruksanvisningen. Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

**5. Hur Bloxoto Pain Relief ska förvaras**


- Bloxoto Pain Relief ska förvaras:
- torrt och vid temperaturer om 15 °C - 25 °C i upprätt läge.
  - i skydd mot frost och ska inte förvaras i kycklåp.
  - i skydd mot direkt solljus.
  - utan syn- och räckhåll för barn.

Bloxoto Pain Relief kan användas i 4 veckor efter att förpackningen har öppnats. Skriv ned datumet på flaskan när du applicerade dropparna första gången (angivningsplats). Efter användning, kassera förpackningen i enlighet med lokala krav.

**6. Övriga upplysningar**

Bloxoto Pain Relief är en medicinteknisk produkt av klass III.

**Förpackning:** Flerdosflaska innehåller 7 g lösning.



(NO)

- Innehåll:**  
 1. Hva Bloxoto Pain Relief er og hva det brukes mot  
 2. Viktig informasjon før bruk  
 3. Hvordan du bruker Bloxoto Pain Relief  
 4. Mulige biverkninger  
 5. Hvordan oppbevares Bloxoto Pain Relief  
 6. Ytterligere informasjon

**Innehållsstoffer:** vannfri glycerol (99,5%), lidokainhydroklorid (0,5%)**1. Hva Bloxoto Pain Relief er og hva det brukes mot**

Bloxoto Pain Relief øredråper er klassifisert som medisinsk utstyr, og effekten er basert på de osmotiske egenskapene til glycerol. Hovedkomponenten i Bloxoto Pain Relief er glycerol. Glycerol har to grunnleggende egenskaper som er relevante for bruk i øredråper:  
 I) den oljige konsistensen til glycerol som fører til at den fester seg forsiktig til huden på påføringsstedet og utgjør midlets beskyttende egenskaper og  
 II) hygroskopisiteten til glycerol, som i sin tur fører til at topisk påført glycerol fjerne vann fra høvet vev (osmotisk effekt), noe som gir redusert hevelse og dermed lindrer smerte.

Glyserolinnholdet i Bloxoto Pain Relief sørger for å mykiggjøre ørevoks, bidrar til å fjerne ørevoks og fjerner overflødig væske fra vevet i øregangen takket være de vannbindende egenskapene (den osmotiske effekten), og eliminerer på den måten plagene som oppstår i forbindelse med betennelsesstilstanden i øret, som for eksempel smerte og hevelse. Glycerol har en kausal effekt. Lidokain er et tilleggsvirkstoff i Bloxoto Pain Relief og brukes som et overflateanestetikum som intensiverer effekten av glycerol og i tillegg lindrer smerte i øret.

Bloxoto Pain Relief virker også mot:

- betennelsesstilstanden som karakteriseres av hevelse, smerte og klee i den ytre øregangen.
- plager som ledsgases av smerte forårsaket av regelmessig ekspanding for vann og fuktighet, f.eks. i svømmebasseng.
- plager som ledsgases av smerte forårsaket av langvarig bruk av hodetelefoner eller av ørevoks som tilstoppet den ytre øregangen.
- plager som ledsgases av smerte forårsaket av høyig bruk av vasemidler som ødelegger den naturlige membranen som beskytter den ytre øregangen, f.eks. sjampo, såpe, hårgel.

Bloxoto Pain Relief kan brukes hos barn fra 6 måneders alder.

**2. Viktig informasjon før bruk****Kontraindikasjoner og advarsler**

- Bruk ikke Bloxoto Pain Relief.
  - dersom pakningen er skadet.
  - dersom trommehinnen er skadet (f.eks. kronisk otitis media).
  - dersom det er oppdaget allergi mot noen av innholdsstoffene i dette produktet.
  - dersom utlopsdatoen som er trykket på pakningen, er overskredet.
  - dersom pasienten nettopp har hatt en operasjon eller fått kirurgisk behandling i øret.
  - til barn under 6 måneder.
  - ved vedvarende smerte eller hevelse forårsaket av en betennelsesstilstand basert på bakterier eller sopp - ved slike plager må lege kontaktes.
  - ved sekresjon fra øret (lekkesaje fra øret).
- Bloxoto Pain Relief skal kun brukes etter grundig undersøkelse av øret (otoskop) hos lege.
- Bloxoto Pain Relief skal ikke brukes i tilfeller der høreapparat har blitt tilpasset. Bloxoto Pain Relief skal brukes én time før høreapparatet settes inn i den ytre øregangen.
- Det finnes ikke bevis for at Bloxoto Pain Relief har en negativ effekt dersom det benyttes under graviditet og amming. Likevel bør bruk av Bloxoto Pain Relief i disse tilfellene konsulteres med en lege, som vurderer om fordelene med Bloxoto Pain Relief overstiger den potensielle risikoen.
- Dersom symptomene blir verre eller du ikke føler deg bedre etter tre dagers bruk av Bloxoto Pain Relief øredråper, eller dersom du har feber, og kontakt lege (vedvarende smerte eller hevelse kan tyde på en bakterie- eller soppinfeksjon som kan kreve ytterligere behandling).
- Bloxoto Pain Relief er kun ment for utvendig bruk. Unngå kontakt med øyne, munn, sveig og nesleslimhinner.
- Bloxoto Pain Relief er beregnet som en midlertidig lindring av smerte i øret, sørge for at det ikke brukes i mer enn 3 dager - må ikke brukes kronisk.

**Bruk sammen med annet medisinsk utstyr eller andre legemidler**

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. Det er imidlertid kjent at antiarytmiske midler forsterker biverkningene av lidokain, og samtidig bruk kan derfor forårsake alvorlige biverkninger. Cimetidin, betablockerere, norepinefrin og inhalasjonsanestetika hemmer lidokainmetabolismen på grunn av redusert blodgjennomstrømning i leveren, noe som fører til økte serumnivåer av legemidlet.

Barbiturater, rifampicin och fenytoin aktselrerer metabolismen av lidokain gjennom aktivering av mikrosomale enzymer i leveren. Lidokain forsterker effekten av muskelavslappnande midler som virker på tverrstript muskulatur. Produsenten anbefaler ikke bruk av andre produkter i form av øre dråper eller spray, under bruk av Bloxoto Pain Relief. Du må rådføre deg med lege eller apotek før du bruker annet medisinsk utstyr eller andre legemidler i form av øre dråper eller spray.

Før bruk av Bloxoto Pain Relief dråper må du informere lege eller apotek om andre produkter som du bruker i øret og alle legemidler du nylig har tatt. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Etter bruk av Bloxoto Pain Relief, er det anbefalt å vente i minst 30 minutter før andre produkter brukes i øret.

### 3. Hvordan du bruker Bloxoto Pain Relief

1. Vask henderne og skru av hætten på flasken.
2. Bøy hodet til siden eller legg deg ned på siden slik at øret som skal behandles, vender oppover.
3. Trekk forsiktig ørefluppen (nedre del av øregangen) ut fra nakken.
4. Snu den åpne Bloxoto Pain Relief-flasken opp-ned og ved å trykke på begge sider av flasken press ut 2 dråper inn i øret.
5. Hold hodet på siden i et par minutter slik at dråpene kommer inn i øregangen.
6. Tar overskydende væske væk med en ren serviet.
7. Derudover anbefales det at stoppe den ydre øregang til med vat etter bruk.
8. Sæt hætten på igjen.

### Dosering

**Voksne og barn over 12 år:** 2 dråper i øret opptil tre ganger daglig. Hvis du ikke opplever forbedring etter 3 dager eller hvis du føler deg verre, ta kontakt med legen din.  
**Barn over 6 måneder:** 2 dråper i øret opptil tre ganger daglig. **Skal kun brukes under opsyn av en voksen eller en lege.** Hvis du ikke opplever forbedring etter 3 dager eller hvis barnet ditt føler seg verre, ta kontakt med legen din.

**Ved bruk hos barn er det nødvendig å beskytte øret med en bomullsldott.**  
**Bloxoto Pain Relief skal ikke brukes til barn under 6 måneder.**  
**Behandlingsresultatet bør overvåkes av en lege.**

### 4. Mulige bivirkninger

Bloxoto Pain Relief er godt tolerert og det er ingen kjente bivirkninger etter bruk. Ved allergi eller andre ønskede virkninger må du slutte å bruke dråpene og informere lege eller apotek. Bloxoto Pain Relief skal kun brukes i tråd med bruksanvisningen. Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i tilknytning til produktet skal rapporteres til produsenten, og den kompetente myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

### 5. Hvordan oppbevares Bloxoto Pain Relief

Bloxoto Pain Relief skal:

- oppbevares på et tørt sted, ved temperaturer mellom 15 °C og 25 °C og i opprett stilling.
- beskyttes mot frost og må ikke oppbevares i kjøleskap.
- beskyttes mot direkte sollys.
- oppbevares utkjøngelig for barn.

Etter første anbrudd av Bloxoto Pain Relief-pakningen kan produktet brukes i 4 uker. Skriv datoen for første påføring av dråper på flasken (angitt sted). Etter bruk skal pakningen kastes i tråd med lokale forskrifter.

### 6. Ytterligere informasjon

Bloxoto Pain Relief er klassifisert som medisinsk utstyr (klasse III).

**Pakning:** Flerdoseflasker som inneholder 7 g oppløsning.



#### Indhold:

1. Virkning og anvendelse af Bloxoto Pain Relief
2. Vigtige oplysninger inden brug
3. Sådan skal du bruge Bloxoto Pain Relief
4. Mulige bivirkninger
5. Opbevaring af Bloxoto Pain Relief
6. Øvrige oplysninger

**Indholdsstoffer:** vandfri glycerol (95,5 %), lidocainhydrochlorid (0,5%)

#### 1. Virkning og anvendelse af Bloxoto Pain Relief

Bloxoto Pain Relief er veltolereret, og der er ingen kendte bivirkninger efter anvendelse af produktet. I tilfælde af allergi eller andre uønskede virkninger: Stop med at anvende øredråberne, og kontakt lægen eller apotekspersonælet. Bloxoto Pain Relief bør kun anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Enhver alvorlig hændelse, der er indruffet i forbindelse med produktet, bør indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugerden og/eller patienten er etableret.

I) glycerols oeligelegende konsistens får det til at binde sig nænsomt til huden på anvendelsesstedet og er dermed årsag til glycerols beskyttende egenskaber, og  
II) glycerol er hygroskopisk, hvilket betyder, at glycerol ved lokal anvendelse fjerner væske fra hævelse (osmotisk virkning), hvilket resulterer i reduceret hævelse og hermed lettelelse af smerten.

Bloxoto Pain Relief indeholder glycerol, som blødgør voks og hjælper med at fjerne det. Ved hjælp af glycerols væskebindende egenskaber, fjernes overskydende væske fra vævene i øregangen (osmotisk virkning), hvilket afhjælper lidelsær, der opstår i forbindelse med betændelsestilstand i øret, såsom øresmerter og hævelse. Lidocain anvendes som et hjælpestof i Bloxoto Pain Relief, idet det virker bedøvende på hudooverfladen, forstærker virkningen af glycerol og giver yderligere lindring af øresmerter.

Bloxoto Pain Relief har en gavnlig effekt på:

- betændelsestilstande kendte tegnet ved hævelse, smerte samt kløe i den ydre øregang.
- smertefulde lidelsær, forårsaget af regelmæssig udsettelse for vand og fugt, f.eks. ophold i svømmepool.
- smertefulde lidelsær, forårsaget af langvarig brug af høretelefoner eller voks, som tilstopper den ydre øregang.
- smertefulde lidelsær, forårsaget af højt brug af rensemidler der ødelægger den naturlige membran, der beskytter den ydre øregang, såsom shampoo, sæbe og gel.

Bloxoto Pain Relief kan anvendes til børn over 6 måneder.

#### 2. Vigtige oplysninger inden brug

##### Kontraindikationer og advarsler

- Anvend ikke Bloxoto Pain Relief:
  - hvis emballagen er ødelagt.
  - hvis trommehinden er skadet (f.eks. kronisk mellemrebændelse);
  - hvis der tidligere er påvist allergi over for et eller flere af indholdsstofferne i produktet.
  - hvis udleøbsdatoen på emballagen er overskredet.
  - umiddelbart efter kirurgi eller kirurgisk behandling i øret.
- **til børn under 6 måneder.**
- i tilfælde af langvarig smerte eller hævelse som følge af en betændelsestilstand, der skydes bakterier eller svamp. Ved sådanne lidelsær skal lægen konsultere.
- i tilfælde af øreflåd - udløb af sekret fra øret.
- Bloxoto Pain Relief bør kun anvendes efter en grundig lægeundersøgelse af øret og trommehinden (otoskop).
- Bloxoto Pain Relief bør ikke anvendes, mens høreapparatet er påsæt. Bloxoto Pain Relief bør anvendes én time før høreapparatet påsættes i den ydre øregang.
- Det er ikke nogen dokumentation for, at Bloxoto Pain Relief øredråber har en negativ indvirking, ved anvendelse under graviditet og amning. Dog bør brug af Bloxoto Pain Relief øredråber drøftes med lægen, som vil vurdere, om de foreventede fordele ved Bloxoto Pain Relief overstiger den potentielle risiko.
- Kontakt lægen, hvis symptomerne tiltager, hvis du ikke oplever nogen bedring efter tre dages brug af Bloxoto Pain Relief øredråber, eller hvis du får feber. Langvarig smerte eller hævelse kan være tegn på en bakterie- eller svampeinfektion, som kræver yderligere og mere hensigtsmæssig behandling.
- Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne, mund, svælg og slimhinder i næsen.

• Bloxoto Pain Relief er beregnet til midlertidig lindring af øresmerter, ikke længere end 3 dages behandling, og bør ikke anvendes over længere tid.

### Anvendelse sammen med andet medicinsk udstyr/andre lægemidler

Der er ikke foretaget studier af interaktioner med andre produkter. Det er imidlertid kendt, at lægemidler mod hjertertymförstyrrelser forværret bivirkningerne ved lidocain. Samtidig brug kan medføre alvorlige bivirkninger. Cimetidin, betablockere, noradrenalin og bedøvelsesmidler til inhalation hemmer metabolismen af lidocain som følge af nedsat gennemstrømming i leveren, hvilket medfører øgede niveauer af lægemidlet i serum.

Barbiturater, rifampicin og phenytoin øger metabolismen af lidocain som følge af aktivering af mikrosomale leverenzymmer. Lidocain forstærker effekten af visse muskelafslappende midler. Fremstilleren fraråder samtidig brug af andre lægemidler eller andet medicinsk udstyr i form af dråber eller spray sammen med Bloxoto Pain Relief. Brug af andre lægemidler eller andet medicinsk udstyr i form af øre dråber eller spray bør drøftes med lægen eller apotekspersonælet. Før anvendelse af Bloxoto Pain Relief bør du fortælle lægen eller apotekspersonælet om andre produkter, du anvender i øret, og om alle lægemidler, du har taget for nylig, herunder håndkøbsmedicin. Efter brug af Bloxoto Pain Relief frarådes det at anvende andre øre produkter i mindst 30 minutter.

### 3. Sådan skal du bruge Bloxoto Pain Relief

1. Vask hænderne, og skru derefter hætten af flasken.
2. Læg hovedet på skrå, eller læg dig ned på siden, så det øre, der skal behandles, vender opad.
3. Træk forsigtigt ørefluppen (nedre del af øregangen) væk fra halsen.
4. Vend flasken med Bloxoto Pain Relief (uden hætte) på hovedet, og dryp 2 dråber ind i øret ved at trykke på begge sider af flasken.
5. Behold hovedet på skrå i et par minutter, så dråberne kan løbe ind i øregangen.
6. Tør overskydende væske væk med en ren serviet.
7. Derudover anbefales det at stoppe den ydre øregang til med vat efter brug.
8. Sæt hætten på igen.

### Dosering

**Voksne og børn over 12 år:** 2 dråber i øret op til tre gange om dagen. Kontakt lægen, hvis du ikke oplever nogen bedring efter 3 dage, eller hvis du får det værre.  
**Barn over 6 måneder:** 2 dråber i øret op til tre gange om dagen. **Må kun anvendes under opsyn af en voksen eller en læge.** Kontakt lægen, hvis dit barn ikke oplever nogen bedring efter 3 dage, eller hvis dit barn får det værre.

**Ved anvendelse hos børn skal øret beskyttes med vat.**

**Bloxoto Pain Relief må ikke anvendes til børn under 6 måneder.**

**Behandlingsresultatet bør kontrolleres af lægen.**

### 4. Mulige bivirkninger

Bloxoto Pain Relief er veltolereret, og der er ingen kendte bivirkninger efter anvendelse af produktet. I tilfælde af allergi eller andre uønskede virkninger: Stop med at anvende øredråberne, og kontakt lægen eller apotekspersonælet. Bloxoto Pain Relief bør kun anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Enhver alvorlig hændelse, der er indruffet i forbindelse med produktet, bør indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugerden og/eller patienten er etableret.

### 5. Opbevaring af Bloxoto Pain Relief

Bloxoto Pain Relief bør opbevares:

- opretstående på et tørt sted ved en temperatur på 15 °C til 25 °C.
- beskyttet mod frost og må ikke opbevares i køleskab.
- beskyttet mod direkte sollys.
- skjult og utilgængeligt for børn.

Efter anbrud af emballagen kan Bloxoto Pain Relief anvendes i 4 uger. Notér datoen foribrugtagning af dråberne på flasken (der er gjort plads til det). Bortskaft emballagen i overensstemmelse med de lokale retningslinjer efter brug.

### 6. Ytterligere oplysninger

Bloxoto Pain Relief er medicinsk udstyr i klasse III.

**Emballage:** Flerdosflaske, der indeholder 7 g oplosning.

Datum for seneste ændring af bruksanvisningen:/  
Data for sisté oppdatering av bruksanvisning/

Data for seneste ændring af brugsanvisningen:

31.08.2023

EmergoPharm Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Jana Ciszewskiego 15  
02-777 Warszawa  
Polen

Bloxoto er et trademark af Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.  
© 2023 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

Temperaturgrænser/Tilladt opbevaringstemperatur/  
Grænse for tilladt opbevaringstemperatur

Se bruksanvisningen/Se bruksanvisningen/  
Se brugsanvisningen

Tillverkare/Tilvirker/Fremstiller

CE-mærkning/CE-overensstemmelsesmerkning/  
CE-mærke

Skydd mot solljus/Beskyttes mot sollys/  
Beskyttes mod sollys

Använd inte om förpackningen är skadad/  
Må ikke brukes hvis pakningen er skadet/  
Må ikke anvendes, hvis emballagen er ødelagd

Serienummer/Serienummer/Serienummer

Sista användningsdatum/Bruk för utløpsdato/Bedst för

Medicinteknisk produkt/Medisinsk utstyr/Medicinsk udstyr

Unik produktidentificering/Unik enhetsidentifikator/Unik udstyridentifikationskode